

Um große Ackerflächen für den Anbau von Futter für die Kühe zu bekommen, wird Regenwald abgeholzt.

Produkt

Auf den Ackerflächen werden Soja- und Maispflanzen als Futter für die Kühe angebaut. Dabei wird chemischer Dünger eingesetzt. Bei dessen Herstellung entsteht Lachgas, das schädlichste Treibhaus.

ktionsl

Damit die Soja- und Maisfelder bearbeitet werden können, benötigt der Bauer Diesel für die Traktoren und Erntemaschinen. Dabei entstehen weitere Treibhausgase.

kette v

Das Futtermittel aus Soja und Mais wird größtenteils von Südamerika mit dem Flugzeug oder Schiff nach Europa transportiert und dort an die Kühe verfüttert.

von Fle

Wenn die Kühe ihr Futter verdauen, pupsen sie große Mengen Treibhausgase (Methan) aus.

isch u

Beim LKW-Transport der Kuh zum Schlachthof oder der Milch zur Molkerei werden weitere Treibhausgase ausgestossen.

nd Milch

Bei der Herstellung von Käse oder Butter aus Milch entstehen noch mehr Treibhausgase. Je höher der Fettgehalt des Produkts, desto mehr Milch wird benötigt und CO₂ frei.

ch pro c

Nicht nur bei der Weiterverarbeitung z.B. zu Wurst und Käse fällt CO₂ an, sondern auch bei der Verpackung der Lebensmittel, beim Transport in den Supermarkt und bei der Lagerung im Kühlregal.

Produkten















